Berdasarkan terjadinya, HERNIA dibagi atas:


- ⋄ Hernia bawaan (kongenital)
- Hernia yang didapat (akuisita)

PENYEBAB:

Hernia dapat terjadi pada semua umur, baik tua maupun muda

Pada anak-anak atau bayi, hernia terjadi karena:

- Kurang sempurnanya procesus vaginalis untuk menutup seiring dengan turunnya testis atau buah zakar



Pada orang dewasa, hernia terjadi karena:

- Adanya tekanan yang tinggi dalam rongga perut (contoh: batuk, susah BAB, pembesaran prostat, mengangkut barang berat)
- Kelemahan otot dinding perut karena faktor usia.


PENANGANAN

- Bila jaringan hernia masih dapat dimasukkan kembali, maka tindakannya adalah hanya menggunakan penyangga atau korset untuk mempertahankan isi hernia.
- Bila sudah tidak dapat direposisi, maka satusatunya tindakan yang harus dilakukan adalah melalui operasi.










Promosi Kesehatan RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual demi kemaslahatan pasien

rsp.unand.ac.id Rumah Sakit Unand rumahsakitunand rumahsakitunand
Alamat : Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang
Call Center : (0751) 8465000

GERNA (Turun Berok)

Adalah penyakit akibat turunnya buah zakar seiring melemahnya lapisan otot dinding perut.



Magam HERNIA menurut letak :


- Hernia diafragma/ epigastric yaitu menonjolnya organ perut kedalam rongga dada melalui lubang pada diafragma (sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut)
- ♥ Inguinasi
- Umbilical yaitu benjolan yang masuk melalui cincin umbilicus (pusar)
- 🦫 Femoral yaitu benjolan di liipat paha

GEJALA

Gejala khususnya muncul berdasarkan berat ringan hernia:

I. Reponible

Benjolan di daerah lipat paha atau umbilikus (pusar) tampak keluar masuk (kadang-kadang terlihat menonjol, kadang-kadang tidak).



2. Irreponible

Benjolan yang ada sudah menetap, baik di lipat paha maupun didaerah pusat.

3. Incarcerata

Benjolan sudah semakin menetap karena sudah terjadi sumbatan pada saluran makanan sudah terjadi di bagian tersebut.

Tak hanya benjolan, keadaan klinis pun mulai berubah dengan munculnya mual, muntah, perut kembung, tidak bisa buang air besar, dan tidak mau makan

4. Stranggulata

Ini adalah tingkatan hernia paling parah karena pembuluh darah sudah terjepit. Selain benjolan dan gejala lain juga muncul, seperti nyeri, demam, dan dehidrasi.

Bila terus didiamkan lama-lama pembuluh darah di daearah tersebut akan mati dan akan terjadi penimbunan racun kemudian akan menyebar ke pembuluh darah. Sebagai akibatnya, akan terjadi sepsis yaitu beredarnya kuman dan toxin di dalam darah yang dapat mengancam nyawa.

