

Penanganan

↪ Penanganan di rumah
Berikan ASI yang cukup (8-12 kali sehari) penyinaran oleh matahari (berjemur)

↪ Penanganan Kuning/Jaundice
Segera hubungi dokter bila bayi tampak kuning :
timbul dalam 24 jam pertama kelahiran kuning menetap >8 hari pada bayi cukup bulan dan >2 minggu pada bayi premature pada observasi di rumah bayi tampak kuning sudah menyebar sampai lutut/ siku tinja berwarna pucat.

Segera bawa bayi ke unit gawat darurat rumah sakit bila :

↪ Jika bayi tampak sakit (menolak untuk minum, tidur berlebihan, atau lengan dan kaki lemas) atau jika bayi tampak mengalami kesulitan bernapas bila suhu lebih dari 37,7 C

Pencegahan Hiperbilirubin

↪ Tidak memberikan cairan tambahan rutin, seperti air pada bayi yang mendapat ASI dan tidak mengalami dehidrasi sering menyusui bayinya paling sedikit 8-12 kali sehari.

Terapi Medis

1. Fototerapi



2. Transfusi Tukar



PERAWATAN BAYI HIPERBILIRUBINEMIA



Promosi Kesehatan RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

**Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual
demi kemaslahatan pasien**

rsp.unand.ac.id [f Rumah Sakit Unand](https://www.facebook.com/RumahSakitUnand) [i rumahsakitunand](https://www.instagram.com/rumahsakitunand) [t rumahsakitunand](https://www.twitter.com/rumahsakitunand)
Alamat : Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang
Call Center : (0751) 8465000

Pengertian Hiperbilirubin

Hiperbilirubin / ikterus neonatorum/ bayi kuning adalah keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan kuning pada kulit dan mata.

Penyebab

- ↪ Faktor fisiologis (perkembangan prematuritas)
- ↪ Berhubungan dengan pemberian ASI
- ↪ Produksi bilirubin berlebihan

Macam-macam Hiperbilirubin

↪ **IKTERIK FISILOGIS** terjadi pada bayi baru lahir setelah 24 jam pertama

↪ **IKTERUS NON FISILOGIS** Kuning terjadi sebelum bayi berumur 24 jam

Tanda-tanda Hiperbilirubin

Ketika kadar bilirubin meningkat dalam darah maka warna kuning akan dimulai dari kepala kemudian turun ke lengan, badan, dan akhirnya kaki, jika kadar bilirubin sudah cukup tinggi, bayi akan tampak kuning hingga ke bawah lutut serta telapak

Cara Memeriksa Warna Kuning :

Dengan menekan jari pada kulit yang diamati & sebaiknya dilakukan dibawah cahaya/sinar matahari.



Perawatan

- ↪ Ibu melaporkan bila bayi mengalami kejang-kejang, gelisah, nafsu menyusui menurun
- ↪ Gunakan alat pompa susu selama beberapa hari untuk mempertahankan kelancaran air susu
- ↪ Mempertimbangkan pemberhentian ASI

