

Cara Pengobatan

- ↪ Istirahat 7 hari sampai 12 hari
- ↪ Pergerakan bertahap
- ↪ Diet cukup kalori dan tinggi protein. Makanan bertahap mulai dari bubur saring, bubur kasar, nasi tim, kemudian baru nasi biasa.
- ↪ Obat-obatan : Klorampenikol, Tiampenikol, kotrimoxazol, Amoxilin dan ampicillin.

Cara Agar Terhindar Dari Typhoid Fever

- ↪ Mencuci tangan
- ↪ Tidak memakan dan minuman mentah
- ↪ Menjaga sanitasi dan higienisan makanan, diri dan lingkungan
- ↪ Hindari makanan dan lingkungan dari kecoa, lalat, dan tikus
- ↪ Melakukan vaksin



1. Gosokkan kedua telapak tangan secara memutar
2. Gosokkan telapak tangan kanan diatas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menyilang secara maju mundur dan sebaliknya
3. Dengan kedua telapak tangan saling menyilang, gosok sela-sela pangkal jari dari dalam ke arah luar
4. Kedua telapak tangan saling menggenggam dengan jari-jari saling mengunci, telapak tangan dan punggung jari saling menggosok
5. Dengan Ibu jari dan telapak tangan kanan menggenggam ibu jari tangan kiri, gosok sela ibu jari dan telunjuk kiri secara memutar dan sebaliknya
6. Gosokkan secara memutar, ujung-ujung jari tangan kanan ditelapak tangan kiri dan sebaliknya.



TYPHOID FEVER



Promosi Kesehatan RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

**Bekerja dengan ilmu,amal, dan spritual
demi kemaslahatan pasien**

Apa itu Typhoid Fever


Typhoid adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah. Masyarakat mengenai penyakit ini dengan nama Tipes atau Thypus.



Apa Penyebabnya ?


Penyebab utama typhoid adalah kuman salmonella

paratyphi A, B, dan C memasuki saluran pencernaan.



Bagaimana Penularan Salmonella Typhi

1. Makanan mentah atau belum masak
2. Jari atau tangan yang kotor
3. Tempat kotor yang banyak lalat atau kurangnya sanitasi dan higienitas
4. Muntahan dan Feses penderita yang mengandung bakteri salmonella typhi.



Gejala Umum Typhoid

- ↪ Demam dengan panas yang makin lama makin tinggi, gejala ini biasanya terjadi pada minggu kedua dan ketiga selama 7-10 hari dan baru turun perlahan-lahan pada minggu keempat.
- ↪ Sering menggigau, dan ingatannya menurun serta gangguan kesadaran
- ↪ Hilangnya nafsu makan, mual, muntah, dan perut terasa sakit
- ↪ Nyeri Otot
- ↪ BAB tidak teratur, sembelit dan diare
- ↪ Sakit kepala yang hebat, menggigil dan pucat
- ↪ Batuk dan peradangan pada cabang tenggorokan
- ↪ Timbul beberapa bercak kecil berwarna merah dada di daerah dada dan perut
- ↪ Pada mulut nafas berbau tidak sedap, bibir kering dan pecah-pecah, dan lidah kotor.